

Anestesia local

Generalmente es segura y no causa efectos secundarios, aparte del **hormigueo/entumecimiento** cuando desaparece la medicación. Otros posibles efectos secundarios:

- pitidos en los oídos
- espasmos
- dolor de cabeza
- mareos
- sabor metálico en la boca

Cuidados anestésicos monitorizados (MAC)

Los efectos secundarios suelen ser mínimos y pueden incluir:

- somnolencia
- náuseas
- vómitos
- dificultad para despertarse de la sedación
- depresión cardiorrespiratoria

Anestesia regional

Similares a los efectos secundarios de la anestesia local, como los enumerados anteriormente, excepto que en una zona más amplia del cuerpo. Los efectos secundarios más específicos de cada bloqueo son:

- Bloqueo femoral/de tobillo: dificultad para mover la pierna
- Espinal: hemorragia, infección, dolor de cabeza intenso, daño nervioso
- Bloqueo interescalénico/hombro – respiración superficial y muy lenta, entumecimiento o caída facial
- Bloqueo del plexo transabdominal (TAP): hematomas en el lugar de la inyección, infección

Anestesia general

Los efectos secundarios de la anestesia general incluyen:

- confusión temporal y/o pérdida de memoria
- mareos/dolor de cabeza
- dificultad para orinar
- náuseas y vómitos
- dolores musculares
- sequedad de boca
- escalofríos/sensación de frío
- dolor de garganta debido al tubo de respiración
- picor, que es un efecto secundario común de los narcóticos

En casos raros, pero graves:

- **Hipertermia maligna (HM): una enfermedad hereditaria que provoca una rápida aparición de fiebre y contracciones musculares. Si usted o un miembro de su familia ha sufrido alguna vez de HM, notifíquelo a su anestesista en su evaluación preoperatoria.**